

DELIRIUM.

Síndrome de disfunción cerebral generalizada caracterizado por (A) disturbio de la conciencia y reducción de la capacidad para dirigir, mantener y cambiar la atención, (B) cambios en las funciones cognitivas que no se deben a demencia, (C) establecimiento rápido y fluctuación durante el día y (D) evidencia de condición médica o de una sustancia etiológicamente relacionada.

EVALUACIÓN.

Observación clínica, test MMSE (≤ 24 puntos), criterios diagnósticos del DSM-IV y CAM. Procedimientos diagnósticos solo para descartar las causas potencialmente reversibles.

Hiperactivo (alucinaciones, ilusiones y agitación motora) ?, Hipoactivo (somnia, retracción emocional e hipoactividad motora) ?, Mixto ?

Causas ?.


Deshidratación	Hipo / hiperglucemia	Insuficiencia renal, uremia
Falla cardíaca	Hipoxemia / hipercapnia	NTIO
Hipercalcemia	Infecciones / sepsis	Síndrome de abstinencia (alcohol)
Hiponatremia	Insuficiencia hepática	Tumor o metástasis cerebral
Drogas (benzodiazepinas, anticolínicos, tricíclicos, difenilhidantoína, corticoides, opioides)		

TRATAMIENTO.

CORREGIR LAS CAUSAS REVERSIBLES, si es posible. Suspender la medicación psicotrópica.
MEDIDAS GENERALES.

Control de síntomas. Evitar la retención urinaria y la constipación. Reducir los estímulos. Explicar al paciente y a la familia el síndrome, las causas posibles, los objetivos y limitaciones del tratamiento; resaltar que el cuadro es producido por una disfunción cerebral que generalmente no es percibida por el paciente.

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.



c = cada
DSM = Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders.
h = hora
IC = infusión continúa
IV = intravenosa

mg = miligramo
MMSE = Mini Mental State Examination
NTIO = neuro-toxicidad inducida por opioides
O = oral
SC = subcutánea